Zentralvenöse Katheter in Radiologenhand – yes we can!

M. Düx

duex.markus@khnw.de

Zentralinstitut für Radiologie & Neuroradiologie

Kathetertypen

ZVK / Sheldon → Akutbehandlung

PORT → 1/2 Lumen (6-10 F / 10-13 F)

**PICC → peripher inserierte zentrale
Katheter (5/7 F; 1/2 Lumen)**

Permanente Katheter → Hickmann
1-3 Lumen, 9-13 F, Tunnel

ZVK, Dialysekatheter

Kurzzeit-/Akutbehandlung

auf Station gelegt →

Radiologie → Rö-Thorax

Lage? → Korrektur? → DL

Komplikationen? → CT?

ZVK, Dialysekatheter

Indikation häufig

meist über V. jugularis

→ V. brachialis, V. subclavia

Korrekturen einfach

selten komplexer bei Fehllage

ZVK, Dialysekatheter

portabler US → Kontrolle

Rö-Kontrolle auf Station

Rö-Kontrolle in Radiologie

Korrektur auf Station möglich

Fehllage vs logist. Aufwand

PORT, PICC

individuell angepasste Katheter

V. jugularis/subclavia vs brachial

für mehrmonatigen Gebrauch

PORT geringste Infektionsrate

PICC Alternative zum PORT

Rückzug, Wechsel, Komplikation

PORT

„in chirurgischer Hand“

OP = Sterilität

ohne Bildsteuerung

Rö-Kontrolle post-Op

Komplikationen, Fehllagen

Chirurgischer PORT

Vollnarkose vs Lokanästhesie

n = 993, 2001-2007

gleiche OP-Dauer & Qualität

billiger: Personal & Material

105/96 & 50/39 Min OP,

Einleitung

482 vs 400 € sig. Kosten Schulz J et al. Zentralbl Chir 2009; 134: 345

Chirurgischer PORT

Rö-Thorax post-OP notwendig?

2% Pneumothorax

alle nicht diagnostiziert

Dx wegen Symptomen 3-72 h

2,4% Fehllagen → Korrektur

→ kein Routinethorax

Brown JR et al. J Am Coll Surg 2009; 208: 517

Radiologischer PORT

Argumente des Chirurgen

Gewohnheitsrecht, Erfahrung

hohe Anforderung an Sterilität

Präparieren? Explantieren?

Komplikationsmanagement?

KH: kein kompetitives Angebot

Radiologischer PORT

Argumente des Radiologen

„kontrollierte“ Anlage (US, RÖ)

Erfolg Rad > Chir (96 / 91%)

weniger Fehllagen

geringere Komplikationsrate

4-Jahres Vergleich: Kosmetik!, Thromboserate, Sepsis/Infektion S > R

0,04/0,53% major complications Patienten-Tage

Marcy et al. Breast Cancer Res Treat 2005; 92: 61

Radiologischer PORT

Argumente des Radiologen

n = 299 Pat.; Erfolg: 99,7%

1 x arterielle Pkt., kein Hämatom
kein Pneu oder neurog. Irritation

0,33 Komplikationen / 1000 Tage

→ 0,15 Infektionen / 0,11 Dysfunktionen

V. jugularis: kein pinch-off, Thrombosen ↓

Radiologischer PORT

Argumente des Radiologen

Komplikationsmanagement

Radiologe = Gefäßspezialist

Engpass OP → Warteliste

Rad. billiger (OP-Kosten)¹

Seldinger Technik 80% → 98%²

Pneu 1-3,2%, Kompl. 2,8%² (0,7%)

¹ *Foley MJ J Vasc Interv Radiol 1995; 6: 255*

² *Seiler et al. Surgical technique...needs improvement:
a multivariate analysis. J Surg Oncol 2006; 93: 24*

PORT: yes we can, but....

Ängste bei Servicebeginn

Lernkurve des Anfängers

Techniken der Präparation

Blutstillung, Explantation

Konflikt mit den Chirurgen

Radiologischer PORT

Strategie des Radiologen

Materialkunde, Technik

Patientenselektion

stumpfe Präparation

Blutstillung → Elektrokauter?

Sterilität

Tipps & Tricks

Dipidolor/Dormicum

Antibiose (Ampicillon 3g i.v., z.B. Unacid^R)

Haut/Unterhaut → 0,5-2 cm Dicke

Punktion unter US-Kontrolle

Valsalva-Manöver → Luftembolie

Pinch-off Area Prävention →

Pkt. äußeres zu mittlerem Clavikuladrittel

Tipps & Tricks

atraumatische saubere Präparation

Portfixierung nicht resorbierbare Fäden

ausreichende Distanz zum Schnitt

spannungsfrei, keine Knickstellen

Beweglichkeit d. Systems

Arterien sicher ligieren

Tipps & Tricks

Katheterpräparation

- DL zur Längenmessung
- finale Korrektur einplanen
- Klemmen nicht genut. Segment
- reibungsfreies Arbeiten

atraumatische Klammern/Pinzetten

Heparinblock (500 IE/Liquemin)

Radiologischer PORT

Strategie des Radiologen

Partner Onkologie

→ Stufenkonzept (Port, PICC)

→ Stärken der Radiologie

→ ambulanter Service

Partner Geschäftsleitung

Ergebnisse

technischer Erfolg: 98-99%

mittlere Tischzeit: 45 (30-90) Min

primäre Offenheit (30 Tage): 97%

Nutzung nach 24 Std. möglich

mittlere Nutzung: 407 (-934) Tage¹

¹ Charvat et al Support Care Cancer 2006; 14: 1162

Komplikationen

Perioperativ ¹ Yildizeli et al J Vasc Ac 2004; 5: 174

Fehlplatzierung **3,1%¹**

Pneumothorax 1-5% **1,3%¹**

Blutung 2-4% **0,9%¹**

arterielle Pkt 7%, Hämatom 1%

Luftembolie **1.7%**

Katheterembolisation **0,4%¹**

Komplikationen

Spät-/Langzeit

Infektion	2,2% ¹
Leckage 1,3% ¹ ; Port-pkt	3,7% ²
Katheterthrombose	1,3% ¹
Katheterfraktur/Migration	1,8% ¹
→ vorzeitige Entfernung	4,4% ¹

¹ Yildizeli et al *J Vasc Ac* 2004; 5: 174;

² Dillon et al *J Pediatric Surg* 2006; 41: 1582

V. subclavia / V. jugularis

Pneumothorax → 0,6-4,3% / 0%

symptom. Subclaviathrombose

→ 0,4% in 1000 Tagen / 0%

Kein Katheter pinch-off

Kein Chylothorax

Keine Plexus brachialis Verletzung

Kosmetik über Clavikula, Offenheit

Radiologischer PORT

Strategie des Radiologen

PICC als Eintrittspforte (CT)

Power-PORT für Kontrollen

PORT für KM = off-label use

nicht kompetitiv, über

Angebot

PORT- Hot-line, Explantation!

indiv. Kosten / Nutzenrechnung

PICC

**ZVK vs PICC → kein Vorteil¹
technisch schwieriger (Pkt)²
Thrombophlebitis
mehr Fehllagen bei Einlage
= Durchführbarkeit, Infektion
Verschluss & Dislokation**

¹ *Turcotte et al World J Surg 2006; 30: 1605*

² *Clin Nutr 2000; 19: 237*

PICC am KHNW

Anlage 20-30 Minuten

Therapie $\geq$ 6 Wochen – 6 Monate

Lokalanästhesie

Thrombophlebitis

lokal behand. & PICC bleibt liegen

Dysfunktion → Katheterwechsel

Katheterpflege 7 Tg transpar. Pflaster

PICC

Pflege

Patientenkomfort

Thromboserate 22-38%^{1,2}

USA: IV Team → PICC³

Pflege involvieren

¹ Abdullah B. *Br J Radiol* 2005; 78: 596

² Periard D. *J Thromb Haemost* 2008; 6: 1281

³ Royer T. *J Infus Nurs* 2001; 24: 326

Permanente Katheter

Hickman-Katheter

1-3 Lumen, 9-13 F, Tunnel

Dacronmanchette → Einwachsen

kontinuier. Zugang, hoher

Fluß

Permanente Katheter

Hickman-Katheter

Kontrollierte Katheteranlage

Radiologie = keine Fehllage

Problem: Präparation?

Rückzug? Eingewachs. Manschette

Komplikationen

Radiologe fester Partner

- Katheterthrombose → Diagnose
lokale Lyse
- Katheterknick/-bruch → Diagnose
- Katheterdislokation → Korrektur
- Migration → Bergung

rw
n-30

W1
W2
E

m

Arzt

Yes we can!!!

PORT, PICC bildgesteuert, minimal
invasiv → ***Komplett-Paket Pat/Zuw.***

Radiologe vs Chirurg

Radiologie billiger

weniger Komplikationen

Stufenkonzept (PORT, PICC)

Anlage, Explantation, Komplikation